





У КОНТРОЛИ болничких инфекција МЕРЕ ИЗОЛАЦИЈЕ подразумевају примену:

1. Стандардних мера предострожности - примењују се код сваког болесника без обзира на дијагнозу
2. Додатне мере предострожности у односу на пут преношења (контакт, капљице, ваздух)

МЕРЕ	<u>СТАНДАРДНЕ</u>	<u>Додатне мере предострожности у односу на пут преношења</u>		
	<u>мере</u>	<u>КОНТАКТ</u>	<u>КАПЉИЦЕ</u>	<u>ВАЗДУХ</u>
 <p>Хигијена руку</p>	ДА	ДА	ДА	ДА
 <p>Рукавице</p>	У контакту са телесним течностима	ДА	У контакту са телесним течностима	У контакту са телесним течностима
 <p>Мантил</p>	Ако је прљање вероватно	Ако ће имати контакт са болесником, средином и предметима у болесничкој соби	Ако је прљање вероватно	Ако је прљање вероватно
 <p>Маска</p>	Ако је могуће прскање	Ако је могуће прскање	Ако је могућа контаминација слузница при поступцима којима се ставрају аеросоли (интубација, сукција, стоматологија итд.)	Специјалне маске

Заштитне
наочаре



Ако је могуће
прскање

Ако је могуће
прскање

Ако је могуће
прскање

Ако је могуће
прскање

Једнокреветна
соба

Не

Да - ако је могуће
(груписати болеснике
са истом инфекцијом
формирати кохорту)

Да

Да, затворена врата

Напомене
уста

Избегавати
контаминацију

Скинути рукавице, мантил,
маску, спровести меру

Омогућити 1м
размака између

Научити болесника да
покрије марамицом нос и

површина рукавицама

хигијене руку пре изласка
из собе

болесника у кохорти

код кашљања и кијања

Литература:

1. Centers for Diseases Control and Prevention. Guideline for Isolation Precautions: Preventing Transmission of Infectious Agents in Healthcare Settings 2007. Доступан на: http://www.cdc.gov/ncidod/dhqp/gl_isolation.html (08.11.2008.)

